






























Nom générique	Nom commercial	Formes	Posologie adulte	Nombre de pilules/jour	Effets secondaires majeurs	Restrictions alimentaires	
Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI)							
3TC, lamivudine	Epivir		Comprimés de 150* et 300mg	150mg deux fois par jour ou 300mg une fois par jour	2 1	Communs: Nausées, vomissements, diarrhées, maux de tête, douleurs abdominales, perte de cheveux, fièvre, insomnie, éruption cutanée, fatigue, nez qui coule, douleurs articulaires Rares: Acidose lactique, foie endommagé	A prendre avec les repas ou à jeun
Abacavir	Ziagen		Comprimés de 300mg	300mg deux fois par jour ou 600mg une fois par jour	2	Communs: Éruption cutanée, nausées, vomissements, diarrhées, fièvre, maux de tête, fatigue, perte d'appétit Rares: Réaction d'hypersensibilité, acidose lactique	A prendre avec les repas ou à jeun
AZT, zidovudine	Retrovir		Gélules de 100 et 250mg*	250mg deux fois par jour	2	Communs: Nausées, vomissements, fatigue, maux de tête, vertiges, faiblesse, douleurs musculaires, perte d'appétit, fièvre Rares: Troubles sanguins, lipotrophie, acidose lactique	A prendre avec les repas ou à jeun
d4T, stavudine	Zerit		Gélules de 20, 30 et 40mg*	Individu de moins de 60kg: 30mg deux fois par jour Individu de plus de 60kg: 40mg deux fois par jour	2	Communs: Lipotrophie, neuropathie périphérique, nausées, diarrhées, douleurs abdominales, reflux gastrique, vertiges, fatigue, éruption cutanée, démangeaisons Rares: Pancréatite, lactacéidose	A prendre avec les repas ou à jeun
ddI, didanosine Libération prolongée	Videx Gel. Gastroresis		Gélules de 125, 200, 250 et 400mg*	Individu de plus de 60kg: 400mg une fois par jour ou 200mg deux fois par jour Individu de moins de 60kg: 250mg une fois par jour ou 125mg deux fois par jour	1 ou 2	Communs: Neuropathie périphérique, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, éruption cutanée, maux de tête Rares: Pancréatite, acidose lactique	A prendre au moins deux heures après ou avant de manger ou de boire quoi que ce soit, sauf de l'eau
FTC, emtricitabine	Emtriva		Gélules de 200mg	200mg une fois par jour	1	Communs: Nausées, diarrhées, maux de tête, taux de créatine-kinase élevé, noircissement de la peau chez les enfants Rares: Acidose lactique, foie endommagé	A prendre avec les repas ou à jeun
Inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INTTI)							
Ténofovir	Viread		Comprimés de 300mg	300mg une fois par jour	1	Communs: Nausées, vomissements, diarrhées, vertiges, taux faible de phosphates sanguins, faiblesse, éruption cutanée, maux de tête, maux d'estomac, fatigue, ballonnement, flatulence Rares: Troubles des reins, perte de densité osseuse	A prendre avec les repas
Combinaisons à dose fixe INTI / INTTI							
3TC / AZT	Combivir		Comprimés contenant 150mg de 3TC et 300mg d'AZT	Un comprimé deux fois par jour	2	Voir le 3TC et l'AZT	A prendre avec les repas ou à jeun
3TC / abacavir / AZT	Trizivir		Comprimés contenant 150mg de 3TC, 300mg d'abacavir et 300mg d'AZT	Un comprimé deux fois par jour	2	Voir le 3TC, l'abacavir et l'AZT	A prendre avec les repas ou à jeun
3TC / abacavir	Kivexa (EU)		Comprimés contenant 300mg de 3TC et 600mg d'abacavir	Un comprimé une fois par jour	1	Voir le 3TC et l'abacavir	A prendre avec les repas ou à jeun
FTC / ténofovir	Truvada		Comprimés contenant 200mg de FTC et 300mg de ténofovir	Un comprimé une fois par jour	1	Voir le FTC et le ténofovir	A prendre avec les repas
Combinaisons à dose fixe INTI / INTTI/INNTI							
FTC / ténofovir / efavirenz	Atripla		Comprimés contenant 600mg d'efavirenz, 200mg de FTC et de 300mg de ténofovir	Un comprimé une fois par jour	1	Voir le FTC, le ténofovir et l'efavirenz	A prendre à jeun, si possible au moment d'aller se coucher
FTC / rilpivirine / ténofovir	Eviplera		Comprimés contenant 200mg de FTC, 25mg de rilpivirine et 300mg de ténofovir	Un comprimé une fois par jour	1	Voir FTC, rilpivirine et ténofovir	A prendre avec les repas
Les inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)							
Efavirenz	Sustiva Stocrin		Comprimés de 600mg* et gélules de 200mg	600mg une fois par jour	1 ou 3	Communs: Éruption cutanée, vertiges, troubles du sommeil, rêves anormaux, troubles de la concentration, nausées, vomissements, maux de tête, fatigue, diarrhées, anxiété, dépression Rares: Psychose, éruption cutanée grave, troubles hépatiques	A prendre à jeun, de préférence au moment de se coucher
Etravirine	Intelence		Comprimés de 100mg et 200mg*	200mg deux fois par jour	2 ou 4	Communs: Éruption cutanée, neuropathie périphérique Rares: Éruption cutanée grave (Syndrome de Stevens Johnson)	A prendre avec les repas
Névirapine	Viramune		Comprimés de 200mg	200mg une fois par jour pendant deux semaines puis 200mg deux fois par jour	2	Communs: Éruption cutanée, vertiges, troubles du sommeil, rêves anormaux, troubles de la concentration, nausées, vomissements, maux de tête, fatigue, diarrhées, anxiété, dépression Rares: Psychose, éruption cutanée grave, troubles hépatiques	A prendre avec les repas ou à jeun
Névirapine Libération prolongée	Viramune XR		Comprimés de 400mg	400mg une fois par jour après une période initiale de traitement à la névirapine non-prolongée	1	Communs: Toxicité du foie, réaction allergique, éruption cutanée, nausées, fatigue, maux de tête, douleurs abdominales, diarrhées Rares: Éruption cutanée grave (syndrome de Stevens Johnson)	A prendre à jeun ou avec les repas
Rilpivirine	Edurant		Comprimés de 25mg	25mg une fois par jour	1	Communs: Insomnie (troubles du sommeil), maux de tête, éruption cutanée, saute d'humeur, dépression Rares: Aux doses supérieures à 25mg, peut provoquer des troubles du rythme cardiaque	A prendre avec les repas
Inhibiteurs de la protéase							
Atazanavir	Reyataz		Gélules de 150, 200 et 300mg*	300mg avec 100mg de ritonavir une fois par jour ou 400mg avec 100mg ritonavir une fois par jour avec l'efavirenz ou la névirapine	2 ou 3 §	Communs: Nausées, diarrhées, éruption cutanée, maux d'estomac, maux de tête, insomnie, vomissements, hyperbilirubinémie, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète, reflux gastrique, jaunisse Rares: Calculs rénaux, fonction hépatique anormale, changement du rythme cardiaque	A prendre avec les repas
Darunavir	Prezista		Comprimés de 400 et 600mg*	600mg avec 100mg de ritonavir deux fois par jour ou 800mg avec 100mg de ritonavir une fois par jour	3 ou 4 §	Communs: Diarrhées, nausées, éruption cutanée, maux d'estomac, vomissements, maux de tête, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète, fièvre Rares: Anomalités hépatiques, changement du rythme cardiaque	A prendre avec les repas
Fosamprenavir	Telzir		Comprimés de 700mg	700mg avec 100mg de ritonavir deux fois par jour	4 §	Communs: Lipides élevés, nausées, vomissements, diarrhées, éruption cutanée, douleurs abdominales, maux de tête, vertiges, fatigue, fourmillement autour de la bouche, changement dans les fonctions hépatiques et pancréatiques, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète Rares: Éruption cutanée grave, changement du rythme cardiaque	A prendre avec les repas ou à jeun
Indinavir	Crixivan		Gélules de 100, 200 et 400mg*	800mg trois fois par jour	6	Communs: Calculs rénaux, douleurs abdominales, lipodystrophie, nausées, vomissements, reflux gastrique, diarrhées, éruption cutanée, maux de tête, vertiges, peau et bouche sèches, fatigue, insomnie, toxicité hépatique, diabète, fluctuation de la numération globulaire, faiblesse Rares: Liver abnormalities, changes in heart rhythm	A prendre une heure avant ou deux heures après les repas ou à prendre avec un casse-croûte léger et faible en matières grasses
Lopinavir / ritonavir	Kaletra		Comprimés contenant 200mg de lopinavir et 50mg de ritonavir	Deux comprimés deux fois par jour ou quatre comprimés une fois par jour	4	Communs: Lipodystrophie, enzymes hépatiques élevés, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, maux de tête, lipides élevés, toxicité hépatique, diabète Rares: Changement du rythme cardiaque	A prendre avec les repas ou à jeun
Ritonavir	Norvir		Gélules de 100mg et comprimés* de 100mg	Dose complète: 600mg deux fois par jour Pour 'potentialiser' d'autres inhibiteurs de protéase: 100 à 200mg une ou deux fois par jour	12 1 à 4	Communs (pour la dose complète): Enzymes hépatiques et lipides élevés, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, maux de tête, faiblesse, sensation d'engourdissement autour de la bouche, mauvais goût dans la bouche, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète Communs (pour la dose faible): Taux de lipides élevé Rares: Changement du rythme cardiaque	A prendre avec les repas pour éviter les nausées
Saquinavir	Invirase		Gélules de 200mg et comprimés* de 500mg	1000mg avec 100mg de ritonavir deux fois par jour	6 §	Communs: Lipodystrophie, nausées, vomissements, diarrhées, éruption cutanée, fatigue, enzymes hépatiques et lipides élevés, toxicité hépatique, diabète Rare: Changement du rythme cardiaque	A prendre dans les deux heures qui suivent un repas
Tipranavir	Aptivus		Gélules de 250mg	500mg avec 200mg de ritonavir deux fois par jour	8 §	Communs: Nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fatigue, maux de tête, fièvre, anomalies hépatiques, éruption cutanée, lipodystrophie, toxicité hépatique, diabète, augmentation des lipides, flatulence Rares: Saignement dans le cerveau, changement du rythme cardiaque	A prendre avec les repas
Inhibiteur de fusion							
T-20, enfuvirtide	Fuzeon		Poudre reconstituée dans l'eau	Injection de 90mg sous la peau deux fois par jour		Communs: Réaction à l'endroit de l'injection, infections des voies respiratoires, neuropathie périphérique, perte de poids	Pas de restriction alimentaire
Inhibiteur de CCR5							
Maraviroc	Celsentri		Comprimés de 150*, 300mg	300mg deux fois par jour ou 150mg deux fois par jour avec tous les IP potentialisés au ritonavir, sauf le tipranavir ou 600mg deux fois par jour avec l'efavirenz ou l'etravirine	2 à 4	Communs: Maux de tête, fatigue, nausées, faiblesse	A prendre avec les repas ou à jeun
Inhibiteur de l'intégrase							
Raltégravir	Isentress		Comprimés de 400mg	400mg deux fois par jour	2	Communs: Maux de tête, insomnie Rares: Réaction d'hypersensibilité, éruption cutanée grave	A prendre avec les repas ou à jeun

*Formule(s) indiquée. § comprend les gélules de ritonavir.

Les rédacteurs ont pris toutes les mesures de prudence nécessaires à la production de ce document. Ni NAM, ni les rédacteurs, ne peuvent être tenus responsables de toutes erreurs ou déclarations incorrectes sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. L'inclusion de toute information sur un traitement ou une thérapie ne représente pas une validation de ce traitement ou de cette thérapie par NAM ou ses rédacteurs. Ces informations doivent toujours être utilisées en association avec des conseils médicaux professionnels.

Contenu & conception financés par le Ministère de la santé du Royaume-Uni. Traduction financée par Merck, Sharp & Dohme.

NAM, Lincoln House, 1 Brixton Road, London, SW9 6DE. Courriel info@nam.org.uk Site Web www.aidsmap.com